



PÔSTER

Cuidado individual, familiar e comunitário

Estudo comparativo do perfil epidemiológico dos diabéticos de Belém - PA

Rafaela Martins Menezes. Centro Universitário do Pará (CESUPA).

rafaelamenezes87@yahoo.com.br

Cristine Bessa Gondim Maia. Centro Universitário do Pará (CESUPA). dra_cristine@yahoo.com.br

Leonnan Pinho Botelho de Sá Oliveira. Centro Universitário do Pará (CESUPA).

leonnabotelho@hotmail.com

Erika Campos Sampaio. erikasampaio@terra.com.br. erikasampaio@terra.com.br

Yuji Magalhães Ikuta. erikasampaio@terra.com.br. yujimikuta@gmail.com

Introdução: O diabetes tem tido um crescimento exponencial da prevalência no Brasil e no mundo. Atualmente são três os critérios aceitos para o diagnóstico de DM: poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual > 200 mg/dl. Compreende-se por glicemia casual aquela realizada a qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeições. Glicemia de jejum \geq 126 mg/dl (7mmol/l).

Objetivos: Comparar o perfil epidemiológico dos diabéticos de Belém-Pará registrados no Hiperdia nos anos de 2011 e 2012, determinando o sexo e a idade mais acometida bem como a existência de sobrepeso, sedentarismo, pé diabético e amputação

Metodologia ou Descrição da Experiência: Os dados foram retirados do DATASUS. A amostra constou de 166 Diabéticos cadastrados no Hiperdia no ano de 2011 e 59 em 2012, incluindo todas as idades, indivíduos de ambos os sexos, que apresentavam os mais diversos fatores de risco como: sobrepeso e sedentarismo, além de pé diabético e ocorrência de amputação. Foi feita uma comparação entre as variáveis no ano de 2011 e 2012, para a verificação de aumento, manutenção ou diminuição dos valores encontrados. As informações foram digitadas e tabuladas em banco de dados para análise estatística dos mesmos. Realizou-se a análise estatística descritiva, sendo informados os valores percentuais dos resultados obtidos.

Resultados: Com relação ao sexo, foi visto um aumento de homens e mulheres de um ano para outro, passando de 43,37% (72 diabéticos) para 47,45% (28) o número de homens e de 56,63% (94) para 57,55% (31) o número de mulheres. A idade mais afetada em ambos os anos foi de 45 a 49 anos, com aumento de 15,66% (26 pessoas) para 18,64% (11 pessoas). O número de pessoas com sobrepeso aumentou de 39,76% (66) para 45,76% (27), juntamente com o número de sedentários que passou de 27,1% (45) para 32,2% (19). Houve redução de diabéticos com pé diabético, passando de 1,8% (3 casos) para 1,69% (1 caso). Sobre a amputação, os valores praticamente se mantiveram, variando de 0,60% (1 caso) para 1,69% (1 caso).

Conclusão ou Hipóteses: Conclui-se que houve um aumento da ocorrência de praticamente todas as variáveis. Medidas devem ser tomadas com o intuito de prevenir fatores de risco, aumentar a captação e o registro de diabéticos no Hiperdia, já que houve uma redução de um ano para o outro; e a partir daí fazer o tratamento adequado para cada situação.

Palavras-chave: Diabetes. DATASUS. Belém.