



PÔSTER

Pesquisa

Uso de álcool entre estudantes no município de Melgaço, Pará

Ronald dos Santos Fonseca. Universidade Federal do Pará. ronaldskill@yahoo.com.br
 José Renato do Vale Ladislau. Universidade Federal do Pará. renatoladislau@hotmail.com
 Liviane Lima Nogueira. Universidade Federal do Pará. liviane.nogueira@bol.com.br
 Gláucia Caroline Silva de Oliveira. Universidade Federal do Pará. gcoliveira@ufpa.br
 Aldemir Branco de Oliveira Filho. Universidade Federal do Pará. olivfilho@ufpa.br

Introdução: Atualmente, o uso excessivo de álcool é considerado um importante problema de saúde pública, sendo responsável por parcela significativa dos óbitos evitáveis. A identificação epidemiológica dos segmentos sócio-demográficos mais susceptíveis à dependência alcoólica é essencial para orientar a formulação de políticas e programas de controle.

Objetivos: Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados à experimentação e ao uso de álcool entre estudantes do ensino médio (EEM) no município de Melgaço, Estado do Pará, Norte do Brasil.

Metodologia ou Descrição da Experiência: Este estudo transversal foi realizado na única escola de ensino médio do município de Melgaço (agosto a novembro de 2011), no qual um questionário de autopreenchimento contendo 40 perguntas foi utilizado para descrição e análise das condições sócio-demográficas, econômicas e familiares relacionadas ao hábito de ingestão alcoólica dos estudantes. A modelagem estatística foi realizada por regressão logística simples e múltipla acompanhada pelo teste Hosmer-Lemeshow.

Resultados: Dos 935 EEM em Melgaço, 921 (98,5%) aceitaram participar desta pesquisa. A faixa etária foi de 14-29 anos ($\pm 5,13$), sendo detectada predominância do sexo feminino (60,37%). A prevalência de experimentação e uso regular de álcool foi de 53,63% e 29,75%, respectivamente. O 1º uso de álcool ocorreu entre 14-19 anos ($\pm 3,16$) e 7-12 anos ($\pm 2,73$) em experimentadores e consumidores, respectivamente. A cerveja (71,17%) foi a bebida alcoólica mais consumida. Os fatores associados ao uso regular de álcool foram: estudar no turno da noite; repetência escolar, não participação dos pais na vida escolar; pais não conversam sobre uso de álcool; pais usam álcool; amigos usam álcool e a maioria dos amigos usam.

Conclusão ou Hipóteses: Em suma, a prevalência de EEM usuários de álcool no município de Melgaço é moderada, sendo que o consumo inicia precocemente, a partir, principalmente, da influência de pais e amigos afetando a vida escolar.

Palavras-chave: Álcool. Melgaço. Epidemiologia.