



PÔSTER

Pesquisa

Uso de tabaco entre estudantes no município de Bagre, Pará

André Luiz Sozinho de Matos. Universidade Federal do Pará (UFPA).

andresozinho_psc@hotmail.com

Liliane Gonçalves de Araújo. Universidade Federal do Pará (UFPA). liane_araujo06@hotmail.com

Alexsander da Silva Martins. Universidade Federal do Pará (UFPA). alexsander_m@yahoo.com.br

Gláucia Caroline Silva de Oliveira. Universidade Federal do Pará (UFPA). gcoliveira@ufpa.br

Aldemir Branco de Oliveira Filho. Universidade Federal do Pará (UFPA). olivfilho@ufpa.br

Introdução: O tabaco é a 2ª droga mais consumida entre os jovens de todo o mundo. Geralmente, a maioria dos jovens começa a fumar ainda na adolescência. Na América Latina, a faixa etária dos 13 aos 15 anos é a que apresenta maior susceptibilidade para o uso do cigarro. A maioria dos fumantes regulares morrem precocemente devido a doenças associadas ao tabaco, perdendo cerca de 20 anos de vida.

Objetivos: Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados à experimentação e ao consumo regular de cigarros entre estudantes do ensino médio (EEM) no município de Bagre, Estado do Pará, Norte do Brasil.

Metodologia ou Descrição da Experiência: Este estudo transversal foi realizado na única escola de ensino médio do município de Bagre (fevereiro a junho de 2012), no qual um questionário de autoperenchimento contendo 40 perguntas foi utilizado para descrição e análise das condições sócio-demográficas, econômicas e familiares relacionadas ao hábito de usar tabaco dos estudantes. A modelagem estatística foi realizada por regressão logística simples e múltipla acompanhada pelo teste Hosmer-Lemeshow.

Resultados: Dos 475 EEM em Bagre, 454 (95,58%) aceitaram participar desta pesquisa. A faixa etária foi de 14-31 anos ($\pm 7,32$), sendo detectada predominância do sexo feminino (55,73%). A prevalência de experimentação e uso regular de tabaco foi de 29,30% e 8,59%, respectivamente. A faixa etária que ocorreu o 1º fumo foi de 8-19 anos e 7-15 anos em experimentadores e consumidores, respectivamente. Entre os EEM fumantes, 74,21% fumam até cinco cigarros/dia. Os fatores associados ao consumo regular de cigarros foram: sexo masculino, repetência escolar, trabalhar esporadicamente; não participação dos pais na vida escolar; pais fumantes; amigos fumantes; a maioria dos amigos fumantes.

Conclusão ou Hipóteses: A prevalência de EEM fumantes no município de Bagre é relativamente moderada, sendo que o uso de tabaco inicia precocemente, a partir, principalmente, da influência de pais e amigos.

Palavras-chave: Tabaco. Bagre. Epidemiologia.