



PÔSTER

Cuidado individual, familiar e comunitário

Produção científica sobre os fatores do desmame precoce

Priscila Veras Santos. Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (UNINOVAFAPI). priscilasantos00@gmail.com

Isabela Bastos Jácome de Souza. Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (UNINOVAFAPI). isabelinhajacome@hotmail.com

MisterlyRabêlo de Oliveira Silva. Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (UNINOVAFAPI). misterly_r@hotmail.com

LíndiaKalliana da Costa Araújo Alves Carvalho. Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (UNINOVAFAPI). lindiakalliana@hotmail.com

Maria do Carmo de Carvalho e Martins. Centro Universitário (UNINOVAFAPI). mcmartins@uninovafapi.edu.br / carminhamartins@ufpi.edu.br

Introdução: A promoção da alimentação adequada entre as crianças é fundamental para sua saúde, crescimento e desenvolvimento.

Objetivos: Analisar estudos publicados sobre o tema nos últimos 7 anos que abordam os fatores referente ao desmame precoce.

Metodologia ou Descrição da Experiência: Trata-se de uma revisão da literatura de estudos publicados na Biblioteca Virtual em Saúde. Os critérios de inclusão foram: recorte de tempo de publicado de 2005 a 2012, artigos originais, em português e serem referentes a aleitamento materno e desmame precoce, utilizando os descritores: aleitamento materno; desmame precoce. Foram localizados 36 artigos, mas atenderam aos critérios de inclusão 16 estudos. Os artigos foram lidos na íntegra e analisados pela análise de conteúdo.

Resultados: Os estudos demonstram que houve um aumento na pratica de aleitamento materno exclusivo nos últimas três décadas, mas ações, promoção e apoio à amamentação devem ser intensificados, pois ainda estão aquém de atingir as metas propostas pela Organização Mundial de Saúde. Fatores mais comuns para justificativa do desmame precoce estão à dimensão sociocultural, a pressão exercida por outras pessoas para o uso de água, chás e outros tipos de leite e a introdução de bicos artificiais.

Conclusão ou Hipóteses: As informações passadas para as mulheres sobre aleitamento foram apreendidas, mas não suficientemente compreendidas para manter o aleitamento pelo período mínimo recomendado de seis meses. É importante compreender que a duração da amamentação não depende de estratégias isoladas, mas sim de diferentes intervenções colocadas em práticas em todo o clico gravídico-púerperal.

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Desmame Precoce. Fatores.