



## PÔSTER

## Pesquisa

### Avaliação dos fatores de riscos para o câncer de colo de útero

Yuji Magalhães Ikuta. Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). yujiikuta@hotmail.com  
 Carinne Costa Vieira. Centro Universitário do Estado do Pará. carinnecvieira@yahoo.com.br  
 Elisa Figueiredo Alves da Silva. Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).  
 e\_lisinhafigueiredo@hotmail.com  
 Caio Vinicius Botelho Brito. Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).  
 caiovbb@yahoo.com.br  
 Catarina Raquel Gemaque Barbosa. Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).  
 catarinagemaque@hotmail.com

**Introdução:** O câncer de colo de útero apresenta na região norte uma relação de 23100000 hab., o mais alto do país, sendo a atenção primária a maior responsável em rastrear e prevenir novos casos. A prevenção seria na mudança dos fatores de riscos mutáveis como, desestímulo ao tabagismo, cuidado com DSTs etc.

**Objetivos:** Avaliar os fatores de risco para o câncer de colo de útero (condições socioeconômicas, início da atividade sexual, tabagismo, número de parceiros sexuais e paridade). Conhecer a incidência de vulvovaginites do PCCU oferecido pela USF Tenoné. Identificar as faixas etárias que mais procuram.

**Metodologia ou Descrição da Experiência:** Trata-se de um estudo analítico descritivo, que foi realizado com a população de mulheres atendidas e cadastradas na Unidade Saúde da Família Tenoné, no período de Fevereiro a Junho de 2012. Foi realizada por meio de aplicação de um questionário e após a obtenção destes, preenchidos, foi avaliado a prevalência das alterações e sua relação com os fatores de risco. Os critérios de seleção incluíram somente mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual ativa e que sejam cadastradas na USF Tenoné.

**Resultados:** A amostra foi constituída de 100 mulheres, dentre os fatores de risco, foi observado que a escolaridade das mulheres submetidas ao questionário era: ensino fundamental completo 35%, era casada 52%, em relação à frequência de realização da Colposcopia, verificou-se que 58% fazem anualmente e as outras 42% o deixam de fazer com tal frequência. A idade do início da atividade sexual, 75% das entrevistadas tiveram coitarca antes dos 18 anos, sendo que 82% já tiveram 3 ou mais parceiros sexuais durante a vida e 46% tem mais de 3 filhos. 23% são tabagistas.

**Conclusão ou Hipóteses:** Na amostra não foi encontrada nenhum caso de neoplasia. As alterações encontradas acometeram todas as faixas etárias, em especial entre 35 a 45 anos. Todos os fatores de risco estudados em relação ao câncer do colo do útero foram observados entre os hábitos de vida das mulheres submetidas ao questionário, o que demonstra a importância da prática de prevenção desta doença entre a população feminina.

**Palavras-chave:** Câncer de Colo de Utero. Colpocitologia oncológica. Fatores de Risco.